

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

IKAR 95 EC[®]

Atest PZH 2824/2013

Adiuwant-preparat wspomagający w formie płynu,
przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową:
– środków owadobójczych stosowanych w leśnictwie
do oprysków ultra niskobojęściowych (ULV)
i niskoobojęściowych (LV) aparaturą naziemną i agrolotniczą;
– środków ochrony roślin i preparatów biobójczych
stosowanych w metodzie zamglawiania
mgłą „zimną” i „gorącą”.

Zawartość substancji aktywnej:
olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej
zawierający węglowodory parafinowe) - 95%

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi
i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją
użycia.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilkanaście minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEKARZEM.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Inne zagrożenia, które nie powodują zaklasyfikowania

Może powodować słabe podrażnienie skóry i oczu przy dłuższym,
bezpośrednim kontakcie.

Może powodować podrażnienie błon śluzowych dróg oddechowych
w przypadku narażenia na rozpylony produkt.

Rozlany produkt stwarza ryzyko poślizgnięcia.

DZIAŁANIE PREPARATU

- IKAR 95 EC powoduje zwiększenie przyczepności środka owado-
bójczego do powierzchni liści, zapobiega zmywaniu preparatu przez
opady i ułatwia wnikanie do rośliny; ogranicza odparowanie wody z kropeł
cieczy użytkowej zmniejszając znoszenie preparatu na sąsiednie uprawy.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Danmar[®]

Towarzystwo Chemiczne
„DANMAR”
ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź
tel./fax: +48 42 650 95 50,
+48 42 650 66 95;
e-mail: biuro@danmar.eu
www.danmar.eu

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Numer partii -



Niebezpieczeństwo

- IKAR 95 EC jako dodatek do cieczy
roboczej środków ochrony roślin lub
preparatów biobójczych powoduje
w metodzie zamglawiania, znaczną
poprawę właściwości mgły „gorącej”
i „zimnej” dając cienką i trwałą war-
stwę depozytu substancji aktywnej.

ZASTOSOWANIE

IKAR 95 EC przeznaczony jest do
łącznego stosowania w leśnictwie
i rolnictwie ze środkami owadobój-
czymi oraz jako nośnik mgły w meto-
dzie zamglawiania.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

I. IKAR 95 EC stosować łącznie ze
środkami owadobójczymi zgodnie
z zaleceniami Instytutu Badawczego
Leśnictwa.

Zalecana dawka: 0,7 - 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 1,3 - 2,3 l/ha

Środek owadobójczy stosować w za-
lecanych dawkach.

II. IKAR 95 EC stosować w metodzie
zamglawiania ze środkami ochrony
roślin i preparatami biobójczymi
zgodnie z zaleceniami ich produ-
centów.

Zalecana dawka: 100 - 200 ml

Zalecana ilość wody: 800 - 1000 ml

Środek ochrony roślin lub preparat
biobójczy stosować w zalecanych
dawkach.

PRZECIWWSKAZANIA

Zachować wszelkie przeciwwskazania
i uwagi jakie obowiązują dla środków,
z którymi stosuje się IKAR 95 EC.

OKRES KARENCJI (okres od dnia
ostatniego zabiegu do dnia zbioru ro-
ślin przeznaczonych do konsumpcji)
- nie dotyczy.

**OKRES PREWENCJI DLA LUDZI,
PSZCZOŁ I ZWIERZĄT** (okres zapo-
biegający zatruciu) - nie dotyczy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKO- WEJ

Przed przystąpieniem do sporząd-
zania cieczy użytkowej dokładnie
ustalić potrzebną jej ilość.

Ciecz użytkową danego środka ochro-
ny roślin przygotować zgodnie z obo-
wiązującą etykietą-instrukcją stoso-
wania w połowie wymaganej ilości
wody i dokładnie wymieszać, nastę-
pnie wlać do zbiornika opryskiwacza
(z włączonym mieszadłem) odmie-
rzoną ilość preparatu IKAR 95 EC,
uzupełnić wodą do wymaganej ilości,
ciągle dokładnie mieszając.

Opróżnione opakowania po środkach
owadobójczych przepłukać trzykro-
tnie wodą, a popłuczyny wlać do zbio-
rnika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszad-
łem.

W przypadku przerw w pracy przed
ponownym przystąpieniem do oprys-
kiwania, ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza dokładnie wymieszać.
Ciecz użytkową sporządzać bezpo-
średnio przed zabiegiem.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć
wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej.

Po pracy aparaturę dokładnie myć.
Wodę użytą do mycia aparatury
wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki
ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSO- WANIA PREPARATU

Przestrzegać wszystkich środków
ostrożności obowiązujących dla środ-
ka ochrony roślin, z którym stosuje
się preparat IKAR 95 EC.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu
podczas używania produktu.

W razie pokłnięcia niezwłocznie za-
sięgnąć porady lekarza, pokazać opako-
wanie lub etykietę.

WARUNKI PRZECZYSZCZANIA I BEZ- PIECZNEGO USUWANIA PREPA- RATU

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać wyłącznie w oryginal-
nym opakowaniu w temperaturze
nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż
30°C.

Nie przechowywać razem z żywno-
ścią, napojami i paszami dla zwierząt.
Używać odpowiednich pojemników
zapobiegających skażeniu środo-
wiska.

Opróżnione opakowania po prepa-
racie traktować jako odpady komu-
nalne.

Niewykorzystany środek przekazać
do podmiotu uprawnionego do odbie-
rania odpadów niebezpiecznych.

ANTIDOTUM: brak, stosować le-
czenie objawowe.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wy-
magana jest lub konieczna inna
pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach skon-
taktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk	(58)	682-04-04
Kraków	(12)	411-99-99
Lublin	(81)	740-89-83
Łódź	(42)	657-99-00
Poznań	(61)	847-69-46
Rzeszów	(17)	866-44-09
Sosnowiec	(32)	266-11-45
Tarnów	(14)	631-54-09
Warszawa	(22)	619-66-54
Wrocław	(71)	343-30-08

MS 1/2015